

ADHS-Medikamente – Übersichtstabelle

Wirkstoff	Handelsnamen	Wirktyp	Einnahmeform	Wirkdauer	Altersfreigabe	Besonderheiten & häufige Nebenwirkungen
Methylphenidat	Ritalin, Medikinet, Concerta, Equasym, Delmosart	Stimulans	Tablette, Retardkapsel, Kautablette, Lösung	3–12 Std (je nach Präparat)	ab 6 Jahren	Appetitlosigkeit, Schlafstörung, Rebound, Reizbarkeit, Herzfrequenzanstieg
Lisdexamfetamin	Elvanse	Stimulans	Kapsel	10–13 Std	ab 6 Jahren	Sanfter Wirkeintritt, weniger Rebound, Appetitverlust, Schlafprobleme, kann Drogentests beeinflussen
Dexamfetamin	Attentin	Stimulans	Tablette	ca. 6 Std	ab 6 Jahren	Stärkerer Wirkeintritt, individuell gut steuerbar, möglicher Missbrauch
Atomoxetin	Strattera	Nicht-Stimulans	Kapsel	24 Std (Spiegelmedikation)	ab 6 Jahren	Wirkeintritt nach Wochen, Suizidgedanken möglich, Appetitverlust, Schlaflosigkeit
Guanfacin	Intuniv	Nicht-Stimulans (alpha2A-Agonist)	Retardtablette	24 Std (Spiegelmedikation)	ab 6 Jahren	Schläfrigkeit, Blutdruckabfall, häufig bei Tics und Aggressionen
Clonidin	Kapilar, Catapresan (off-label bei ADHS)	Nicht-Stimulans (alpha2-Agonist)	Tablette	6–12 Std	off-label	Müdigkeit, Schwindel, Blutdrucksenkung, manchmal bei Schlaf- & Ticproblemen
Bupropion	Elontril, Wellbutrin	Antidepressivum / Noradrenalin-Dopamin-Wiederaufnahmehemmer	Tablette	24 Std (Spiegelmedikation)	ab 18 Jahren	Unruhe, Schlaflosigkeit, Risiko bei Epilepsie, wirkt bei manchen gegen ADHS